

Schemat monitorowania czynności wątroby podczas stosowania leku Agomelatine NeuroPharma


- Agomelatine NeuroPharma 25 mg**
 Przed rozpoczęciem leczenia dawką 25 mg
 AIAT U/I
 AspAT U/I
- Tydzień 3
 AIAT U/I
 AspAT U/I
- Tydzień 6
 AIAT U/I
 AspAT U/I
- Tydzień 12
 AIAT U/I
 AspAT U/I
- Tydzień 24
 AIAT U/I
 AspAT U/I
- Należy przeprowadzić badanie w dowolnym czasie, jeśli jest to klinicznie wskazane.

- W przypadku zwiększenia dawki do 50 mg należy ponownie zastosować schemat monitorowania
- Rozpoczęcie leczenia dawką 50 mg
 AIAT U/I
 AspAT U/I
- Tydzień 3
 AIAT U/I
 AspAT U/I
- Tydzień 6
 AIAT U/I
 AspAT U/I
- Tydzień 12
 AIAT U/I
 AspAT U/I
- Tydzień 24
 AIAT U/I
 AspAT U/I
- Należy przeprowadzić badanie w dowolnym czasie, jeśli jest to klinicznie wskazane.

Dane osobowe pacjenta:

.....

Data rozpoczęcia:



* takie jak ciemne zabarwienie moczu, jasne zabarwienie stolca, zażółcenie skóry/oczu, ból w prawej górnej części brzucha, utrzymujące się nowo powstałe i niewyjaśnione zmęczenie